

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量/10アール当たり		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数						
				薬量 (㎎)	希釈水量 (ℓ)									
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布 50~100	3回以内	-	3回以内						
		多年生雑草		500~1000										
かんきつ		マルバツユクサ		1000~2000	100			3回以内	-	5回以内				
		スギナ		2000										
		一年生雑草		250~500	通常散布 50~100 少量散布 25~50									
		多年生雑草		500~1000										
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	2回以内	雑草茎葉 散布			3回以内				
		多年生雑草		500~1000										
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250~500				50~100	1回	-	1回以内			
		多年生雑草		500~1000										
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250~500							50~100	2回以内	-	2回以内
		多年生雑草		500~1000										
水田作物 (水稲を除く)	-	一年生雑草	耕起20~10日前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	3回以内	-							3回以内
移植水稲														
直播水稲				500~750				50~100	2回以内	-				2回以内
麦類(小麦を除く)														
小麦				500~750				50~100	3回以内	-	2回以内			
雑穀類												500~750	50~100	3回以内
野菜類 (だいこん、えだまめ、豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)、いちも類、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、なす、アスパラガス、オリーブ(葉)、たらのぎ、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、とうがらし類、にんじん、ピーマン、薬用にんじんを除く)				500~750	50~100	3回以内	-	1回						
とうがらし類 にんじん ピーマン だいこん									500~750	50~100	3回以内	-	2回以内	
アスパラガス オリーブ(葉) たらのぎ びわ(葉) ほうれんそう レタス トマト きゅうり な				500~750	50~100	3回以内	-	3回以内						
しゃくやく (薬用)									500~750	50~100	3回以内	-	10回以内 (1年間に2回以内)	
薬用にんじん	500~750	50~100	3回以内	-	3回以内									
ねぎ						500~750	50~100	3回以内	-	3回以内				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量/10Aール当たり		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量(㎖)	希釈水量(ℓ)			
たまねぎ	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500	100	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
えだまめ			耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)		少量散布 25~50			
			収穫7日前まで (雑草生育期)		100			
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)			は種後出芽前 (雑草生育期)		少量散布 25~50	2回以内		
			耕起前又はは種前まで (雑草生育期)					
だいず			は種10日以前 (雑草生育期)		100	1回		
			は種後出芽前まで (雑草生育期)					
かんしょ			耕起前(雑草生育期)		少量散布 25~50	2回以内		
いも類 (かんしょを除く)			耕起前又は植付前まで (雑草生育期)					
茶			摘採7日前まで (雑草生育期)		500~1000	6回以内		
さとうきび	収穫30日前まで (雑草生育期)							
飼料用 とうもろこし	-	一年生及び 多年生雑草	耕起前又は植付前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	2回以内		
			は種後出芽前まで (雑草生育期)					
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生雑草	更新・造成の10日以前 (雑草生育期)	500~1000	50	2回以内		
		多年生雑草						
林木	造林地 (地ごしらえ)	一年生及び 多年生雑草	は種10日前~は種当日 (耕起整地後)(雑草発生前期)	250~500	30	1回	雑草木茎葉 散布	1回
		ススキ、 ササ類等の 多年生雑草、 落葉雑かん木	生育盛期以降 (夏~秋期)					
樹木類	-	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	4回以内	雑草茎葉 散布	4回以内
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄道 等	多年生雑草	スギナ	500	50~100	4回以内	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉 散布	3回以内
				1000	100	3回以内		
				2000	50~100	3回以内		

## 注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
					つる径(cm)	使用量(㎖/株)			
林木	林地	クス・フジ等の つる類	生育初期	原液又は2倍液	2cm以下	0.5㎖/株	1回	つる 注入処理	1回
					2.1~3.0cm	1.0㎖/株			
	3.1~4.0cm	1.5㎖/株							
	4.1~5.0cm	2.0㎖/株							
					5.1cm以上	適宜増量			
	林地 放置竹林	落葉雑かん木	生育期 (5~10月)	原液	1㎖/力所		1回	立木 注入処理	1回
樹径(cm)					力所数				
10cm以下					2~3				
					10~20cm	4~8			
					20cm以上	10			
	林地 放置竹林	竹類	夏期	原液	5~10㎖/本			竹稈 注入処理	